

Antennaria Gaertn. – Кошачья лапка*Antennaria dioica***Antennaria dioica (L.) Gaertn. – Кошачья лапка двудомная**

Почти циркумполярный бореальный. Сухих боров, лугов, редколесий.

Корневище тонкое ползучее, побеги разветвленные, стелющиеся, укореняющиеся с розетками листьев на верхушке. Стебли 5–30, покрыты войлоком. Прикорневые листья 1–4 см дл., 3–10 мм шир., лопатчатые, к основанию суженные в черешок, на верхушке округлые, иногда с коротким остроконечием; стеблевые более мелкие, ланцетно-линейные или линейные, с обеих сторон или только снизу беловойлочные. Корзинки по 3–10 на верхушке стебля в щитковидно-головчатом соцветии. Листочки обертки белые или розовые.

Дх: перевал из Чикоя в Мензу, истоки р. Буркал, на полянах в массе, 10.07.2006, А.В. Галанин, А.В. Беликович; склон Перевального хребта, подгольцовые лиственничные леса, 31.07.2002, А.В. Галанин, А.В. Беликович; **Сохондинский заповедник:** дно долины р. Букукун у дороги геологов, ерники на каменистых россыпях, 29.07.2007, Е.Н. Роечко.

Во Флоре Центральной Сибири (1979) указан для Дс (сел. Большой Куналей, г. Улан-Удэ) и Дх (гора Сохондо). В.И. Грубов (1982) указывает для Хэнтея и северо-запада Монголо-Даурского района.

Antemis L. – Пупавка**Anthemis subtinctoria Dobrocz. (A. tinctoria L.) – Пупавка светло-желтая**

Евразийский бореально-неморальный. Сухих лугов, лесных полян, обочин дорог, сорных мест.

Растение до 60 см выс. Стебель прямой, ветвистый, слабо опушенный двураздельными волосками. Листья перистораздельные, 2–4 см дл., 1,5–3 см шир.; доли их перистонадрезанные на ланцетовидные, остроконечные дольки. Корзинки одиночные, до 3 см в диам., на концах длинных, к верхушке безлистных ветвей. Обертка полушаровидная, беловойлочная, 12–17 мм шир., наружные листочки ланцетные, острые, в 2 раза короче внутренних, внутренние – продолговато-ланцетные, приостренные, по краю узко пленчато окаймленные. Язычковые цветки желтые, продолговато-эллиптические, 12–13 мм дл., 3,5–4 мм шир.; цветки диска трубчатые, желтые, с венчиком около 3,5 мм дл. Цветоложе полушаровидное, пленчатое; пленки линейно-ланцетные, килеватые, оттянутые в длинное крепкое острие, почти равное трубчатым цветкам. Семянки сжатые, трехугольные, бороздчатые, около 2 мм дл., на верхушке с короткой коронкой.

В наших сборах вид не отмечается. Во Флоре Центральной Сибири (1979) для Даурии не указывается, в сводке В.И. Грубова (1982) этот вид отсутствует. Однако во Флоре Сибири (1997, т. 13) вид приводится как для юга Бурятии, так и для всего Забайкалья.

*Anthemis subtinctoria***Arctium L. – Лопух, Репейник****Arctium tomentosum Mill. – Лопух войлочный**

Евразийский плюризональный. Рудеральное.

Двулетнее растение до 150 см выс. Стебель грязно-пурпурный, в верхней части ветвистый; опушение паутинистое, из негустых прилегающих у основания расширенных белых волосков. Листья крупные, яйцевидные, по краю выемчатые с расставленными короткими острыми зубчиками; верхние – зеленые, с рассеянными прижатыми волосками; нижние стеблевые – серо паутинисто-войлочные, с сидячими желтыми железками; прикорневые – на длинных черешках. Обертки корзинок густо паутинистые, липкие, наружные листочки крючко-

ватые, внутренние – шире, ланцетные, на верхушке фиолетовые, без крючков на концах. Венчик темно-пурпурный, редко белый. Семянки 4–7 мм дл., слабо морщинистые, серо-бурые, пестро-черные, с зигзагообразным рисунком.

Во Флоре Центральной Сибири (1979), в сводке В.И. Грубова (1982) и во Флоре Сибири (1997, т. 13) вид для Даурии не приводится. Однако он указан для Дс в Определителе растений Бурятия (2001).

Arctogeron DC. – Арктогерон

Arctogeron gramineum (L.) DC. – Арктогерон злаковый

Даурский эндем, аридный. Петрофитных степей и прерий.

Многолетнее растение 5–10 см выс., с разветвленным толстым скрученным корневищем. Каждая из многочисленных коротких веток корневища несет густой пучок листьев и один цветонос. Цветоносы 5–10 см выс., густо опушены длинными извилистыми волосками, внизу окутаны сухими прошлогодними листьями. Листья все прикорневые, новые серо-зеленые, 1,5–10 см дл., узкие, до 1 мм шир., почти щетиновидные, жесткие. Корзинки одиночные, 1,5–2 мм в диам., обертка колокольчатая, трехрядная, черепитчатая. Листочки обертки около 8 мм дл, линейные, острые, опушенные. Язычковые цветки вдвое длиннее обертки, бледно-сиреневые, после отцветания закручиваются назад. Цветы диска желтые. Семянки продолговатые, двухгранные, густо опушенные, около 4 мм дл. Хохолок из белых щетинок, вдвое длиннее семянки.

Дж: Монголия, нац. парк «Гора Хогнохан», сухая степь на педименте склона, 25.06.2007, А.В. Галанин, А.В. Беликович.

Дн: р. Нерча в 10 км выше устья, каменистая степь на надпойменной террасе, 15.07.2004, А.В. Галанин, А.В. Беликович.

До: 45 км на ВСВ от м. Дульдурга, 7,5 км на СВ от с. Зуткулей, разнотравная степь, 11.07.2007, Е.Н. Роенко; заказник «Горная Степь», степь на гребне сухого каменистого склона, 28.07.2004, А.В. Беликович, Е.Н. Роенко; **Монголия:** р. Онон в 17 км к северо-востоку от с. Дадал, степь в распадке, 16.08.2005, А.В. Галанин, А.В. Беликович.

Дс: р. Кудара в 1 км от с. Ивановка, каменистая степь на вершине горы, 15.07.06, А.В. Галанин, А.В. Беликович.

Дя: **Алханайский нац. парк:** 20 км к востоку от с. Ара-Иля, степь на равнинном участке, 19.07.2005, А.В. Галанин, А.В. Беликович.


Во Флоре Центральной Сибири (1979) указан для Дс, Дя, До, Дв. В.И. Грубов (1982) приводит для всех районов Монголии, относящихся к Даурии (карта 3).

Artemisia L. – Полынь

1. Одно- или двулетние растения с тонким корнем3
 - + Двулетние или многолетние растения 2
2. Полукустарники и полукустарнички (растения с одревесневшей и перезимовывающей нижней частью стебля, поднимающейся над поверхностью почвы на 5–50 см) 11
 - + Травянистые растения с одревесневшим каудексом, обычно расположенном на уровне почвы 22
3. Растения зеленые, голые или слегка волосистые 4
 - + Растения сероватые или беловатые от густого войлочного опушения, или сизые, покрытые прижатыми простыми или двухконечными волосками5
4. Нижние и средние стеблевые листья трижды рассеченные. Конечные дольки их 1–2 мм дл. и 0,5 мм шир., продолговато-ланцетные, цельнокрайние или с 1–2 зубчиками **A. annua** L.
 - + Листья просто- или дважды перистые. Конечные дольки 2–3 см дл. и 0,2–0,5 мм шир., нитевиднo-линейные **A. palustris** L.



Arctium tomentosum



Arctogeron gramineum